


Date : 02/07/2018

Herbophyl'Hebdo : Les conditions sont estivales, implantez des dérobées fourragères !

La pousse : Les conditions séchantes (chaleur et vent) ont ralenti la pousse de l'herbe au niveau de la région. Les trois secteurs du Nord et du Pas de Calais maintiennent tout de même 45 Kg MS/ha/j.

Noter qu'un nouveau site vient enrichir la carte à Wesprohem (62). Dès maintenant notre équipe compte un nouveau membre : Dany Hennebelle d'OXYGEN.



Alimentation des troupeaux laitiers :

Les rations uniquement à base d'herbe montrent des baisses de quantité de lait et accusent aussi des diminutions de taux. Dans ces situations un complément énergétique peut s'avérer utile pour les vaches et les génisses plus fraîchement vèlées.

Les complémentations sont à ajuster.

	20 ares/VL	30 ares/VL	40 ares/VL	50 ares /VL
Avec une pousse de 40 kg MS/ha/j	8 Kg de MS aliment 2 Kg correcteur	5 Kg MS aliment 1,5 Kg correcteur	2 Kg MS aliment 1 Kg correcteur	0 Kg MS aliment 0 Kg correcteur

La fauche : un bon millésime !

Grâce aux bonnes conditions météorologiques, les foins et toutes les deuxièmes coupes (prairies, luzerne) sont terminés. La repousse va être longue particulièrement dans les parcelles où le foin était couché.

Rendements en foin très bons : on atteint facilement 5 à 6 tonnes MS/ha dans les 1ères coupes.

Entretien des parcelles :

L'ébousage par temps sec reste à proscrire, tout comme il faut éviter d'épandre du lisier.

Cultures dérobées :

Même si les prairies ont un bon rendement depuis ce printemps, il faut refaire des stocks. Avec une moisson précoce (beaucoup de zones ont fini les escourgeons), les conditions sont idéales pour semer tôt des intercultures récoltables début octobre. Les critères à prendre en compte sont nombreux (type de sol, rotation, mode d'exploitation, date de semis...), n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers pour vous aider dans vos choix. Voici toutefois quelques exemples :

- Après escourgeon pour un semis mi-juillet :

- Ray-gras italien alternatif courte durée à 25 Kg/ha
- Avoine rude + Vesce commune + Trèfle d'Alexandrie à 22-25 Kg/ha
- Avoine diploïde + Vesce commune à 30 Kg/ha
- Moutarde d'Abyssinie + Trèfle d'Alexandrie à 8-10 Kg/ha

- Après blé pour un semis août et double récolte automne 2018 + printemps 2019 :

- Ray-gras Italien non alternatif à 20 Kg/ha + Trèfle Incarnat à 7,5 Kg/ha
- Seigle multicaule (50 %) + Avoine rude (50%) à 22-25 Kg/ha
- Seigle multicaule (60%) + Vesce commune d'hiver (30%) + Trèfle incarnat (10%) à

25 Kg/ha

Attention aux parcelles ayant reçu un herbicide à base de sulfonilurées : il faudra faire un petit labour pour éviter les rémanences des produits.

Les Herbophyles

Chambres d'Agriculture	Aisne	Leborgne Gaëtan	06 18 51 01 54	Avenir Conseil Elevage	Lejeune Raphaël	06 85 50 81 91	HERBOPHYLES CONTACTS DU GROUPE REGIONAL		
	Oise	Récopé Christelle	06 73 74 33 61						
	Somme	Traullé Simon	03 22 20 67 30						
	Nord	Dewilde Quentin	06 42 59 01 11		Gruener Sophie	06 84 95 94 39			
	Pas-de-Calais	Pruvost Olivier	06 85 08 60 45						
						Oxygen Conseil Elevage	Hennebelle Dany	06 71 18 94 89	