



Date : 06/05/2019

Herbophyl'Hebdo : Les faucheuses dans les starting-blocks !

Pousse de la semaine du 29/04 au 06/05 : Pas si frileuse !

Hormis dans le 62, la pousse de l'herbe reste dynamique. Le ternois souffre en effet d'une grande amplitude thermique et d'un manque d'eau qui freine la croissance des graminées.

Dans le reste de la région, ce sont surtout les prairies pâturées ras qui marquent le pas. Sinon l'ouest de la Picardie affiche une pousse surprenante dépassant les 100 KgMS/ha/j.

Cumuls des températures depuis le 1er février :

06/05/2019	2018	2019	Différence	Evolution
Abbeville	714	845	131	66
Sivry	603	769	166	58
Beauvais	673	793	120	60
Dunkerque	721	883	162	71
Lille	715	861	146	68
Reims	684	787	103	62
St Quentin	697	797	100	63
Boulogne	693	853	160	66

Le rafraîchissement des températures commence à se faire sentir et le gain quotidien est d'à peine 10 °C. Pour rappel, il faut 110 °C jour au RGA pour faire 1 feuille ! En conséquence, les prairies pâturées ras ont du mal à se développer.

Fauche : Profitez de la prochaine fenêtre météo !

Après des dérobées au rendement honorable (4 tMS/ha en RGI), les premières récoltes en prairies permanentes du 1^{er} mai sont bonnes (3,5 tMS/ha). Maintenant, le stade optimal pour des ensilages/enrubannages à forte valeur alimentaire est dépassé ; les vulpins sont en graines, les brômes sont épiés, les dactyles amorcent l'épiaison et chaque jour on perd en UF et MAT.

Il faut donc être prêt à faucher d'autant plus qu'avec la pluie, l'herbe se couche.

C'est également toujours la période pour faire des analyses foliaires !


Ce n'est pas seulement vrai pour les prairies permanentes ! Les prairies temporaires de mélanges et les luzernes sont également au bon stade pour une récolte en voie humide.

Pour des récoltes en foin en revanche, on peut encore attendre.

Pâturage :

La dynamique de pousse des derniers jours a offert beaucoup de jours d'avance. Il n'est pas rare de voir certains éleveurs débordés. Il faut profiter des prochaines fauches pour débrayer des parcelles trop développer et retrouver des hauteurs de pâturage optimales. Avec le retour des chaleurs et une fauche pas trop rase (> 5cm) la repousse sera rapide. De même le pâturage ne doit pas non plus être trop agressif (> 5cm) pour la même raison.

La technique du « topping » peut permettre de gérer très ponctuellement un gros volume d'herbe à pâturer mais ce ne doit pas être systématique et très limité dans le temps. Pour rappel, il s'agit là de faucher l'herbe et laisser les animaux la ramasser. Utile pour limiter le gaspillage, il est primordial de bien estimer la quantité d'herbe disponible pour le lot d'animaux concerné ; le recours au fil est souvent conseillé.



Les Herbophyles

Chambres d'Agriculture	Aisne	Leborgne Gaëtan	06 18 51 01 54	Avenir Conseil Elevage	Lejeune Raphaël	06 85 50 81 91	HERBOPHYLES CONTACTS DU GROUPE REGIONAL		
	Oise	Récopé Christelle	06 73 74 33 61						
	Somme	Traullé Simon	03 22 20 67 30						
	Nord	De Wilde Quentin	06 42 59 01 11		Gruener Sophie	06 84 95 94 39			
	Pas-de-Calais	Pruvost Olivier	06 85 08 60 45				Oxygen Conseil	Hennebelle Dany	06 71 18 94 89

