



Date : 20/05/2019

## Herbophyl'Hebdo : Une pousse hétérogène selon les secteurs

La pousse de cette semaine reste identique en moyenne sur la région par rapport à la semaine dernière. Cependant, il faut noter une disparité entre les différentes mesures effectuées sur nos 5 départements. La zone côtière et l'Avesnois gardent une pousse dynamique alors qu'ailleurs la pousse commence à ralentir.

### Cumuls des températures depuis le 1er février :

19/05/2019	2018	2019	Différence	Evolution
<b>Abbeville</b>	879	1006	127	87
<b>Sivry</b>	780	908	128	74
<b>Beauvais</b>	844	940	96	80
<b>Dunkerque</b>	888	1048	160	86
<b>Lille</b>	899	1025	126	88
<b>Reims</b>	866	936	70	83
<b>St Quentin</b>	874	949	75	82
<b>Boulogne</b>	858	1010	152	85

Sur la bande côtière et la région lilloise, on atteint les 1000 °C ; c'est-à-dire la somme de températures optimum pour réaliser les foins. Le reste de la région n'atteindra cette somme que d'ici une semaine. (+ 80 °C sur une semaine en moyenne)

### Gestion des refus :


Broyer ou faucher ? C'est la quantité de biomasse qui doit conditionner votre choix. - Si il y a juste quelques épis de graminées et des adventices : le broyage suffit. Si la biomasse est plus importante, la solution du « topping » est préconisée, c'est à dire on fauche juste avant l'entrée des animaux qui se chargent eux même du ramassage. Sur les systèmes laitiers, le ramassage des refus est préconisé quand la biomasse est très importante pour privilégier une repousse homogène sur toute la parcelle.

### Stock fourrager :

La plupart des premières coupes en ensilage ou en enrubannage sont faites à ce jour. Les premières estimations des rendements sont en moyenne à 3.5 tonnes de MS/ha. Cela correspond à une année normale même s'il peut y avoir des variations selon les secteurs. Néanmoins, c'est le moment d'estimer ces stocks pour s'assurer un bilan fourrager positif.

Certaines récoltes en ensilage ont été faites avec un taux de matière sèche trop élevé car resté au sol trop longtemps. La conservation risque de ne pas être bonne. Il faudra donc être vigilant sur la tenue du front d'attaque pour ne pas pénaliser les performances des animaux.

## Les Herbophyles



Chambres d'Agriculture	Aisne	Leborgne Gaëtan	06 18 51 01 54	Avenir Conseil Elevage	Lejeune Raphaël	06 85 50 81 91	<b>HERBOPHYLES</b> CONTACTS DU GROUPE REGIONAL		
	Oise	Récopé Christelle	06 73 74 33 61						
	Somme	Traullé Simon	03 22 20 67 30						
	Nord	De Wilde Quentin	06 42 59 01 11		Gruener Sophie	06 84 95 94 39			
	Pas-de-Calais	Pruvost Olivier	06 85 08 60 45				Oxygen Conseil	Hennebelle Dany	06 71 18 94 89

