




Date : 09/03/2020

## Herbophyl'Hebdo : un début de saison retardé par la pluviométrie

Les Chambres d'agriculture des Hauts de France en partenariat avec Avenir Conseil Elevage et Oxygen Conseil Elevage ont mis en place un observatoire régional de suivi de la croissance de l'herbe depuis 2004.

Cette année, les mesures herbomètres sont réalisées dans les prairies de fauche et de pâturage de 23 exploitations réparties sur toute la région (cf la carte).

Ce suivi de la pousse de l'herbe est un outil d'aide à la décision pour vous aider dans la gestion du pâturage. Il vise à donner des repères aux éleveurs pour améliorer le pâturage et anticiper les grandes étapes de la pousse de l'herbe : le retrait des parcelles du circuit de pâturage pour la fauche, l'adaptation de la complémentation pour éviter le gaspillage et économiser des stocks ...




## Repérez les stades clés de la pousse de l'herbe :

A chaque stade, correspond une pratique. Les sommes de température permettent de repérer les stades importants de la pousse de l'herbe : départ en végétation, épis 5 cm du sol, épiaison, floraison.

Les sommes de température, exprimées en degré jours se calculent en additionnant les moyennes quotidiennes à partir du 1<sup>er</sup> février avec un minimum à 0°C et un maximum à 18°C car au-delà il n'y a plus d'effet sur la majorité de la flore :

$$\text{Température moyenne} = \frac{\text{Température mini} + \text{Température maxi}}{2}$$

Nous avons calculé ce cumul de température sur quatre zones déterminées sur la carte :



	Somme des températures	Début de végétation	
		Prairie précoce : 200°C jour	Prairie tardive : 400 °C jour
	Au 8 mars	200 °C	400 °C
<b>Bande côtière</b>	290 °C	25 février	-
<b>Pays de Bray</b>	281 °C	24 février	-
<b>Zone intérieure</b>	270 °C	27 février	-
<b>Avesnois Thiérache</b>	223 °C	4 mars	-

On considère qu'à 200 °C degré jour, il y a reprise de la végétation. En 2020, les 200 °C jour sont atteints depuis fin février pour la Zone du Pays de Bray, la Bande côtière et la Zone Intérieure. Pour l'Avesnois Thiérache, les 200°C ont été obtenus la semaine dernière.

Entre 300 et 400 °c et en fonction du type de prairie et de la portance, le déprimage peut démarrer.

Cependant cette année est particulière au vue des précipitations importante en eau. La somme des températures reste un moyen de pilotage de l'herbe mais n'est pas le seul critère à prendre en compte dans la reprise de la végétation et l'exploitation des prairies.

## Les Herbophyles

<b>Chambre d'agriculture</b>	<b>Aisne</b>	Leborgne Gaëten	06 18 51 01 54
	<b>Oise</b>	Récopé Christelle	06 73 74 33 61
	<b>Somme</b>	Leroy Claire	06 86 37 56 68
	<b>Nord</b>	De Wilde Quentin	06 42 59 01 11
	<b>Pas de Calais</b>	Pruvost Olivier	06 85 08 60 45
<b>Oxygen Conseil Elevage</b>	<b>Pas de Calais</b>	Hennebelle Dany	06 71 18 94 89
<b>Avenir Conseil Elevage</b>	<b>Nord</b>	Gruener Sophie	06 84 95 94 39
	<b>Picardie</b>	Lejeune Raphaël	06 85 50 81 91