



Date : 30/03/2020

Herbophyl'hebdo : Des températures moins clémentes !

Pousse de la semaine : Ralentie et hétérogène

Le vent du Nord-Est froid et sec impacte énormément les parcelles qu'il balaye. Un assèchement précoce et superficiel apparaît à la surface de ces parcelles. La pousse reste néanmoins hétérogène :

Avesnois le Cateau Cambrasis	43 Kg à 30 Kg pousse /jour
Noyonnais	38 Kg
Thiérache –Boulonnais	15 Kg
Côte picarde	8.5 g

Comme on peut le constater, il y a des zones où la pousse est à l'arrêt.

Les températures basses de cette semaine expliquent en partie ces différences. Les gelées matinales pénalisent la repousse de l'herbe pâturée. En effet les prairies ayant été déprimées ou pâturées depuis 3 semaines repoussent deux fois moins vite que les prairies n'ayant pas encore été consommées. Attention, avec ces températures à ne pas descendre en dessous de 4 cm pour garder une bonne dynamique de repousse.

Gestion du pâturage : Une herbe aux valeurs inhabituelles.

Les conditions de pousse actuelles ont un effet sur la valeur des sucres du fourrage. En effet, dans les systèmes très pâturant la sortie à l'herbe occasionne souvent une montée de production. Hors en ce moment les taux d'urée dans le lait sont haut (> 400) et le lait se fait toujours attendre.

La valeur de l'herbe actuellement est plus proche d'une herbe d'automne. La différence entre azote et énergie semble plus importante. Dans cette situation, il faut avoir un point de vigilance particulier pour les animaux qui démarrent en lactation, ne pas hésiter à les soutenir, jusqu'à ce que l'herbe retrouve ses conditions poussantes. Les espèces les plus précoces comme les vulpins sont en cours d'épiaison dans quelques secteurs. Si les animaux ne le sont pas encore sortis à l'herbe, la mise au pâturage doit s'effectuer ces jours, tout au moins quelques heures l'après-midi.

Semi de méteil : la question se pose d'emblaver certaines parcelles inoccupées.

Si tel est votre cas, les méteils peuvent servir de couvert aux prairies temporaires ou aux luzernes.

Un semi méteil seul : Pour l'utilisation en fourrage, on recherche à maximiser la proportion de légumineuses et protéagineux (au loin 50 % du mélange).

Ex : 40 kg à 50 Kg d'avoine, 15 Kg à 20 Kg vesce et 20 à 30 Kg de pois / ha

En sous couvert : 30 Kg d'orge, 20 Kg pois et 30 Kg de prairies temporaires mélangées ou 25 kg de luzerne.

On réalisera le semi de la grosse graine puis le semis de la petite à 0.5 cm. Pour finir impérativement par un passage de rouleaux.

Dans tous les cas, il faut que la terre soit réchauffée pour intervenir.

Cumuls des températures depuis le 1er février :

En moyenne, une évolution de – 2 °C / jour entre la semaine dernière et cette semaine. L'avance par rapport à l'année dernière se résorbe.

28/03/2020	2019	2020	Différence 2019 2020	Evolution entre 2 semaines
Abbeville	450	460	10	48
Sivry	398	377	-21	39
Beauvais	423	441	18	37
Dunkurque	484	482	-2	50
Lille	445	444	-1	49
Reims	412	449	37	39
St Quentin	417	427	10	42
Boulogne	455	445	-10	49
Cambrai		432		43

Les Herbophyles

Chambre d'agriculture	Aisne	Leborgne Gaëten	06 18 51 01 54
	Oise	Récopé Christelle	06 73 74 33 61
	Somme	Leroy Claire	06 86 37 56 68
	Nord	De Wilde Quentin	06 42 59 01 11
	Pas de Calais	Pruvost Olivier	06 85 08 60 45

Oxygen Conseil Elevage	Pas de Calais	Hennebelle Dany	06 71 18 94 89
-------------------------------	----------------------	-----------------	----------------

Avenir Conseil Elevage	Nord	Gruener Sophie	06 84 95 94 39
	Picardie	Lejeune Raphaël	06 85 50 81 91

