



Date : 06/04/2020

Herbophyl'Hebdo : Pâturez Juste !

Pousse de la semaine :

La pousse est très variable selon que les parcelles viennent d'être pâturée ou non. En effet, lorsque la surface foliaire est très faible, les repousses sont plus longues à redémarrer. Le froid et le vent a accentué ce phénomène.

Boulonnais - Avesnois	27 Kg MS/jour
Noyonnais	58,5 Kg MS/jour
Thiérache - Côte picarde - Pays de Bray	32-36 Kg MS/jour
Cambrésis	11 Kg MS/jour

Gestion du pâturage :

A ce jour, la mise à l'herbe est faite pour ¼ des situations. Le sol est sec en surface et les pissenlits sont petits et en fleurs ; ceci reflète les sommes de températures faibles. La repousse est timide donc pas de surpâturage. Il faut maintenir une complémentation pour ceux qui en ont ou sinon changer de parcelle.

Pour les autres, il faut y aller car la pousse va s'accélérer avec l'élévation des températures.



Pour vous aider à gérer : rappel des jours d'avance :

Le calcul des jours d'avance est **un indicateur clé pour la gestion du pâturage**. Il correspond au nombre de jours pendant lesquels le stock d'herbe disponible sur les parcelles d'un lot permet de couvrir les besoins de ce lot.

$$\text{Jours d'avance} = \frac{(\text{Hauteur moyenne} - \text{hauteur de sortie}) \times \text{densité prairie} \times \text{surface}}{\text{Besoins journaliers des animaux du lot}}$$

Les jours d'avance sont à calculer à différents moments clés :

	Cumul T°C	Objectif	Si + de jours	Si – de jours
Bovin Lait	400°C	20 jrs	Diminuer la complémentation à l'auge	Maintenir ou augmenter la complémentation à l'auge
	550°C	20 jrs	Débrayer une ou plusieurs parcelles pour la fauche	
Bovin Viande	350°C	15 à 20 jrs	Mettre à l'herbe très rapidement Ne pas sur-pâturer (max 6 cm)	Faire pâturer les parcelles destinées au foin avant 500°C Augmenter la période de transition Retarder la mise à l'herbe
	650°C	15 jrs max	Débrayer une ou plusieurs parcelles pour la fauche	

Cumuls des températures depuis le 1er février :

En moyenne, une évolution de 7,3 °C / jour entre la semaine dernière et cette semaine.

05/04/2020	2019	2020	Différence	Evolution
Abbeville	525	510	-15	50
Sivry	468	425	-43	48
Beauvais	495	487	-8	46
Dunkerque	556	543	-13	61
Lille	523	499	-24	55
Reims	486	493	7	44
St Quentin	493	475	-18	48
Boulogne	529	502	-27	57
Cambrai		485		53

Le stade des 400 °C est dépassé, la mise à l'herbe est primordiale. C'est un moment crucial de l'année de pâturage où se mêlent excitation « on a envie de voir les animaux dehors » et crainte « il ne faut pénaliser la pousse de l'herbe et éviter les problèmes métaboliques ».

Les 500 °C d seront atteints au cours de la semaine. Les animaux devront être sortis des parcelles destinées à la fauche pour ne pas pénaliser le rendement.

Les Herbophyles



Chambres d'Agriculture des Hauts de France

www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr

Chambre d'agriculture	Aisne	Leborgne Gaëten	06 18 51 01 54
	Oise	Récopé Christelle	06 73 74 33 61
	Somme	Leroy Claire	06 86 37 56 68
	Nord	De Wilde Quentin	06 42 59 01 11
	Pas de Calais	Pruvost Olivier	06 85 08 60 45
Oxygen Conseil Elevage	Pas de Calais	Hennebelle Dany	06 71 18 94 89
Avenir Conseil Elevage	Nord	Gruener Sophie	06 84 95 94 39
	Picardie	Lejeune Raphaël	06 85 50 81 91