



## Fiche 1

La suppression d'une traite hebdomadaire est une solution intéressante pour se libérer de l'astreinte de l'élevage une demi journée par semaine. C'est une technique simple à mettre en œuvre à condition de bien maîtriser la qualité du lait.



AMÉLIORER  
LES CONDITIONS  
DE TRAVAIL



DIMINUER L'ASTREINTE



RÉDUIRE LE VOLUME  
DE TRAVAIL



ALLÉGER LES POINTES  
DE TRAVAIL



PLUS DE TEMPS LIBRE



SÉCURISER,  
LA MAIN-D'OEUVRE



### Maîtriser la qualité du lait avant de se lancer

- Cette technique peut être mise en œuvre toute l'année ou seulement sur une période donnée, car les vaches s'habituent assez rapidement.
- Elle s'adresse plutôt aux élevages ayant de bons résultats de qualité du lait, peu concernés par les mammites.
- La mise en place s'avère aisée, toutefois le choix de la traite supprimée ne doit pas changer d'une semaine sur l'autre.
- Cette pratique ne nécessite pas de modifications dans l'alimentation du troupeau toutefois il est conseillé de ne pas distribuer la ration le dimanche soir.
- Il est souhaitable de retarder la traite du dimanche matin et d'avancer celle du lundi matin afin de limiter la perte de production.
- La suppression d'une traite implique des variations sensibles de production et de composition du lait à l'échelle de la semaine. Par conséquent, il est préférable d'avertir votre contrôleur laitier et votre laiterie.

### Une légère baisse de production sans conséquence sur la qualité

- On constate une forte augmentation du taux butyreux le lendemain de la suppression de la traite et une quasi stabilité du taux protéique.

COMPARAISON ENTRE 2 LOTS DE 15 VL AU COURS DES 5 PREMIERS MOIS DE LACTATION (HIVER 2001-2002) - Source : Institut de l'élevage

MOYENNES HEBDOMADAIRES	14 TRAITES/ SEMAINE	13 TRAITES/ SEMAINE	ECARTS ENTRE LOTS
Lait (kg/VLJ)	34,2	33,9	- 0,3
TB (g/L)	39,6	40,3	+ 0,7
TP (g/L)	31,0	31,4	+ 0,4
Caséines (g/L)	24,6	24,9	+ 0,3

- La congestion temporaire de la mamelle se traduit par une augmentation de la concentration en cellules somatiques durant les 48 heures suivantes.
- Il n'y a pas d'augmentation significative des cas de mammites, ni même des mammites cliniques le lendemain.

### Du temps libre très appréciable

Cette technique permet de se libérer du dimanche en cours de matinée au lundi matin. Le fait de disposer du dimanche après-midi et d'une soirée entièrement libre est très apprécié.

Toutefois, le travail du lundi matin se trouve augmenté en raison d'une durée de traite allongée de 15 à 20 mn ainsi que pour l'entretien du logement des vaches (paillage, raclage...).





## Fiche 1



### **Chez Marie-Hélène et Michel Robiquet, il a suffi d'oser franchir le pas ...**

#### **A quelle occasion avez-vous mis en place cette technique ?**

« C'est après une réunion à laquelle mon mari participait, où cette technique a été présentée. Il est rentré et après en avoir discuté ensemble nous avons pris la décision d'essayer. Depuis février 2007, nous ne réalisons plus la traite du dimanche soir. Nous décalons également la traite du dimanche matin à 8h au lieu de 6h30. »

#### **Pour quelles raisons avoir adopté ce principe ?**

« Par confort personnel, cela nous permet de disposer de notre dimanche sans avoir à se préoccuper du remplacement pour la traite. »

#### **Quelles sont les conséquences sur la quantité et la qualité du lait ?**

« Nous n'avons pas de problèmes de mammites, en novembre par exemple nous avons 80 000 cellules, pour une moyenne annuelle de 128 000 cellules. Nous sommes vraiment vigilants pour maintenir ce niveau d'hygiène. Si jamais il y avait un problème un jour, nous pourrions être amenés à revenir en arrière.

Sur le plan de la quantité, les pertes de lait sont de l'ordre de 4% sur la production de la semaine. »

#### **Quelles recommandations donneriez vous pour mettre en place cette technique ?**

« Déjà, il faut être prêt mentalement pour franchir le cap. Il vaut mieux avoir la chambre éloignée de la stabulation, car c'est stressant d'entendre les vaches, surtout la première fois. Aujourd'hui les animaux se sont habitués. C'est pourquoi on peut conseiller de démarrer en période de pâturage. L'essentiel est d'être bon en cellules. »

#### **L'EXPLOITATION :**

- ▶ Mr et Mme Robiquet à Oisy (02)
- ▶ 1 couple et 1 salarié à mi-temps
- ▶ 90 ha de SAU, 61,5 ha de SFP, 35% de maïs/SFP
- ▶ 60 VL à 9000 kg, 530 000 l de lait produit
- ▶ 1845 kg de concentrés & co-produits/ VL
- ▶ Logettes tapis, conçoit d'alimentation, DAC
- ▶ 40% d'EBE/Produit Brut (moyenne sur 5 ans)

#### **DES CONTACTS POUR ALLER PLUS LOIN...**

- Louis Bruneel ELC3  
Téléphone : 03 22 90 14 13
- Rémy Hannequin CA 80  
Téléphone : 03 22 20 67 37
- Sébastien Juliac CA 02  
Téléphone : 03 23 22 50 62
- Christelle Récopé CA 60  
Téléphone : 03 44 11 45 12

#### **RÉDACTEURS DE LA FICHE :**

- Sébastien JULIAC  
(Chambre d'agriculture 02)
- Jean-Pierre DEPIL  
(Chambre d'agriculture 02)