



**10/03/20 : Synthèse des reliquats azotés - département de la Somme
issus du réseau Chambre d'agriculture (1537 échantillons)**

PRECEDENTS	Secteurs	Sols profonds					Sols superficiels			
		H1 (0-30cm)	H2 (30-60cm)	H3 (60-90cm)	TOTAL 2020 H1 + H2 + H3 (uN/ha)	nombre échantillons	H1 (0-30cm)	H2 (30-60cm)	TOTAL 2020 H1 + H2 (uN/ha)	nombre échantillons
Céréales pailles enlevées sans MO avec CIPAN	PPN	25	23	11	59	21	26	20	46	28
	PPS	24	21	12	57	27				
	PV	30	21	9	60	67				
	SV	24	24	15	63	28				
Céréales pailles enlevées sans MO sans CIPAN	PPN	23	16	11	50	8	26	19	45	33
	PPS	22	17	15	54	43				
	PV	26	18	10	54	60				
	SV	22	19	19	60	20				
Céréales pailles enfouies sans MO avec CIPAN	PPN	26	20	9	55	19	28	16	44	24
	PPS	27	20	10	57	33				
	PV	27	15	11	53	11				
	SV	25	22	14	61	144				
Céréales pailles enfouies sans MO sans CIPAN	PPN	21	17	10	48	17	22	16	38	31
	PPS	21	17	13	51	37				
	PV	22	18	17	57	10				
	SV	25	20	15	60	72				
Colza	PPN	26	20	17	63	25	32	20	52	18
	PPS	27	22	18	67	36				
	PV	27	19	17	63	23				
	SV	25	23	21	69	30				
Betterave	PPN	22	21	14	57	22	25	21	46	23
	PPS	22	17	14	53	25				
	PV	24	17	11	52	36				
	SV	22	20	16	58	110				
Lin fibre	PPN	25	16	18	59	11	-	-	-	-
	PPS									
	PV	27	18	12	57	44				
	SV	25	20	20	65	11				
Mais ensilage	PPN	25	18	16	59	12	27	21	48	17
	PPS	21	17	15	53	21				
	PV	27	19	14	60	55				
	SV	23	23	21	67	3				
Mais grain	PPN	23	19	22	64	27				
	PPS									
	PV									
	SV									
Pommes de terre (conso + féculé)	PPN	27	23	19	69	16	22	23	45	14
	PPS	21	18	18	57	15				
	PV	23	17	15	55	43				
	SV	23	22	25	70	81				
Pois protéagineux	PPN	24	16	18	58	18	25	17	42	15
	PPS									
	PV									
	SV									
Pois de conserve	PP	22	22	18	62	7	-	-	-	-
	PV	23	13	12	48	12				
	SV	25	21	21	67	17				
Haricots verts et flageolet	Département	22	21	22	65	17	-	-	-	-
Moyenne générale	Département	25	20	15	60	1334	25	18	43	203

PPN : Plateau Picard Nord - PPS : Plateau Picard Sud - PV : Ponthieu Vimeu - SV : Santerre Vermandois

REMARQUES COMPLEMENTAIRES

- Les valeurs sont données sans apport organique. En cas d'apport organique en été-automne en précédents céréales à pailles, ajouter + 5uN
- En sol superficiel, adaptez votre valeur de reliquat suivant votre profondeur de sol. Exemple : craie 30 cm à 60 cm
- Pour les colzas en place, la valeur du reliquat est de 20uN/ha en sol superficiel, et 30uN/ha en sol profond.
- Sur céréales à pailles, betteraves, endives, maïs, lin, grosses carottes, salsifis, sorgho, tournesol, chicorée prendre la valeur TOTAL (H1+H2+H3).
- Sur les carottes (hors grosses carottes) et le tabac : prendre en compte la valeur de l'horizon 1 et 2 (H1 + H2).
- Sur les pommes de terre et les légumes (hors carottes, endives, salsifis): prendre en compte la valeur de l'horizon 1 + 50 % de l'horizon 2 (H1 + 50% H2).